

## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage, 80 mg/ pipetă, soluție spot-on pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie de talie mare

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare pipetă de **0,8 ml** conține:

<b>Substanța activă:</b>	
Imidacloprid	80 mg
<b>Excipienți:</b>	
Butilhidroxitoluen (E321)	0,8 mg
Alcool benzilic (E1519)	665,6 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot-on.

Soluție limpede de culoare galbenă până la maroniu.

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1 Specii țintă

Pisici și iepuri-animale de companie.

### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă


Pentru pisici cu greutatea corporală de 4 kg și mai mult:

Prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici (*Ctenocephalides felis*).

Pentru iepuri-animale de companie cu greutatea corporală de 4 kg și mai mult:

Tratamentul infestărilor cu purici.

Puricii sunt omorâți în decurs de o zi după tratament. Un tratament previne infestarea ulterioară cu purici timp de trei până la patru săptămâni la pisici și până la o săptămână la iepuri-animale de companie. Produsul poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament



pentru controlul dermatitei alergice la purici (DAP) la pisici, unde aceasta a fost diagnosticată anterior de un medic veterinar.

#### **4.3 Contraindicații**

Nu tratați pisoi neînțărcați cu vârsta mai mică de 8 săptămâni.

Nu tratați iepurii-animale de companie cu o vârstă mai mică de 10 săptămâni.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

#### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Re-infestarea după apariția puricilor noi în mediul înconjurător poate continua să apară timp de șase săptămâni sau mai mult după inițierea tratamentului. Prin urmare, poate fi necesar mai mult de un tratament, în funcție de nivelul infestării cu purici din mediul înconjurător. Pentru a ajuta la reducerea încărcăturii din mediu, se recomandă utilizarea suplimentară a unui tratament pentru mediul înconjurător adecvat împotriva puricilor adulți și a etapelor lor de dezvoltare. Pentru a reduce în continuare provocarea ecologică, se recomandă ca toate pisicile și iepurii dintr-o gospodărie să fie tratați. Tratamentul pisicilor care alăptează combate infestarea cu purici atât pe femelă, cât și pe descendenți.

Produsul rămâne eficient dacă animalul devine umed, de exemplu după expunerea la ploie abundente. Cu toate acestea, repetarea tratamentului poate deveni necesară, în funcție de prezența puricilor în mediul înconjurător. În aceste cazuri, nu tratați mai des de o dată pe săptămână.

#### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

##### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Acest produs este pentru uz extern și nu trebuie administrat pe cale orală.

Aplicați numai pe pielea sănătoasă fără leziuni.

Trebuie asigurate măsuri de precauție deoarece conținutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau cu gura animalului.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă/îngrijească reciproc.

Înainte de aplicarea produsului trebuie îndepărtată orice zgardă.

Înainte de a monta din nou zgarda, trebuie evaluată vizual zona tratată pentru a se verifica că este uscată.

##### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la imidacloprid trebuie să evite contactul cu produsul.

Acest produs conține alcool benzilic și poate provoca sensibilizarea pielii sau reacții cutanate tranzitorii în cazuri rare (de exemplu, iritații, furnicături).

Evitați contactul produsului cu pielea, ochii sau cu gura. Nu masați locul de aplicare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii bine cu multă apă.



Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, solicitați asistență medicală.  
După aplicare, nu mângâiați sau îngrijiți animalele până când locul de aplicare nu este uscat.  
Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat asistență medicală.  
Spălați bine mâinile după utilizare.

#### Alte precauții:

Solventul din acest produs poate păta anumite materiale, inclusiv piele, țesături, materiale plastice și suprafețe finisate. Lăsați locul de aplicare să se usuce înainte de a permite contactul cu astfel de materiale.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Produsul are gust amar și ocazional, poate să apară salivăție dacă animalul linge locul de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un semn de intoxicație și dispare în câteva minute fără tratament.

În cazuri foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) pot să apară reacții cutanate cum ar fi: căderea părului, roșeață, mâncărime și leziuni ale pielii la pisici și iepuri. Agitație, salivăție excesivă și semne nervoase: cum ar fi lipsă de coordonare, tremurături și depresie au fost, de asemenea, raportate, dar în mod excepțional la pisici.

Ingerarea orală poate duce la alte semne gastro-intestinale (vărsături și diaree) care au fost observate foarte rar pe baza datelor de după comercializare.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)
- frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Nu au fost observate efecte toxice asupra reproducerii la șobolani și nu au fost observate efecte toxice primare embriotoxice sau teratogene în timpul studiilor pe șobolani și iepuri. Studiile pe pisici gestante și pe cele care alăptează ca și pe descendenții lor sunt limitate. Rezultatele obținute până în prezent arată că nu apar efecte adverse la aceste animale.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu au fost observate interacțiuni între acest produs administrat în doză dublă și următoarele produse medicinale veterinare utilizate în mod frecvent: lufenuron, pirantel și praziquantel (pisici). A fost de asemenea demonstrată compatibilitatea produsului cu o gamă largă de tratamente de rutină aplicate în condiții de teren, inclusiv vaccinarea.



#### 4.9 Cantități de administrat și calea de administrare


Acest produs este pentru uz extern și nu trebuie administrat pe cale orală. Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de tratament.

Schema de dozare și tratament:

Greutatea pisicii, iepurelui [kg g.c.]	Produs	Număr de pipete	Imidacloprid [mg/kg g.c.]
≥ 4 kg	Advantage 80 mg pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie	x 0,8 ml	minim 10


#### Mod de administrare

Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsuciți și scoateți capacul. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui prin răsucire și apăsați desigilați pipeta.




#### Administrarea la pisici


Îndepărtați părul de pe gâtul pisicii la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.



#### Administrarea la iepuri

Îndepărtați părul de pe gâtul iepurelui la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.





#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)**

La pisici nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de cinci ori mai mari decât doza terapeutică administrată săptămânal, timp de opt săptămâni consecutiv. La iepuri nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de până la 45 mg/kg greutate corporală ( de 4 ori doza terapeutică) administrate săptămânal timp de 4 săptămâni consecutiv.

În cazuri rare de supradozare sau linsul blăniî tratate, la pisici pot să apară tulburări ale sistemului nervos (cum ar fi zvâcniri, tremor, ataxie, midriază, mioză, letargie). Este puțin probabil ca animalele să se otrăvească prin ingerare accidentală. În acest caz se aplică tratament simptomatic sub supraveghere medicală veterinară. Nu există antidot specific, dar poate fi benefică administrarea de cărbune medicinal activ.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Nu se utilizează la iepuri care sunt destinați consumului uman.

### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz extern; imidacloprid  
Codul veterinar ATC: QP53AX17

#### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Imidaclopridul 1-(6-Cloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilideneamine este un ectoparaziticid aparținând unui grup de compuși cloronicotinilici. Din punct de vedere chimic, este descris mai exact ca o cloronicotinil nitroguanidină.

Această substanță are o afinitate crescută față de receptorii nicotinerfici de acetilcolină din regiunea post-sinaptică a sistemului nervos central (SNC). Inhibiția continuă a transmisiei colinergice determină paralizia și moartea insectelor. Datorită interacțiunii scăzute cu receptorii nicotinerfici ai mamiferelor și penetrării scăzute a barierei hemato-encefalice, nu are practic nici un efect asupra SNC al mamiferelor. Activitatea farmacologică minimă la mamifere a fost demonstrată în urma studiilor de siguranță efectuate prin administrarea sistemică la iepuri, șoareci și șobolani a unor doze sub-letale.

Studii suplimentare au demonstrat că pe lângă efectul adulticid (distructiv asupra puricilor adulți), imidacloprid are și un efect de distrugere larvicid (al larvelor de purici) care se

găesc în zona unde se află animalul tratat. Stadiile larvare ale puricilor din împrejurimile animalului de companie sunt distruse după ce vin în contact cu un animal tratat.

## **5.2 Particularități farmacocinetice**

Calea de administrare a produsului este cea cutanată. După aplicarea topică (cutanată) la pisici soluția se distribuie rapid la nivelul dermului animalului. Studiile cutanate acute efectuate pe șobolani, supradozările la speciile țintă și studiile cinetice serice, au demonstrat că absorbția sistemică este foarte scăzută, pasageră și nu este relevantă pentru eficacitatea clinică. Acest lucru a fost demonstrat în continuare printr-un studiu în care pielea și blana au fost curățate de substanța activă iar puricii care s-au hrănit de pe aceste animale tratate anterior nu au murit.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipienților**

Butilhidroxitoluen (E 321)

Alcool benzilic (E 1519)

Carbonat de propilen

### **6.2 Incompatibilități majore**

Nu se cunosc.

### **6.3 Perioadă de valabilitate**


Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare 5 ani.

### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A se păstra blisterul în cutia de carton.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Dimensiunea ambalajului	0,8 ml soluție pentru o pipetă Blister cu 2 pipete, doză unică. Blister cu 3 pipete, doză unică. Blister cu 4 pipete, doză unică. Blister cu 6 pipete, doză unică.
Pipeta	Pipetă din polipropilenă albă cu capac înșurubat
Cutie de carton	Fiecare cutie de carton conține un blister.



Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

#### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu produsul sau recipientele goale.

#### **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bayer Animal Health GmbH,  
51368, Leverkusen,  
Germania

#### **8. NUMERELE AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

150163

#### **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: 05.04.2006


Data ultimei reînnoiri: 13.05.2015

#### **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

08.2021

#### **INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Nu este cazul.



**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton, cu 2, 3, 4, 6 pipete

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Advantage, 80 mg/pipetă, soluție spot-on pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie de talie mare

Imidacloprid

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

Fiecare pipetă de 0,8 ml conține:

Substanță activă: imidacloprid 80 mg

butilhidroxitoluen (E 321) 0,8 mg

alcool benzilic (E 1519) 665,6 mg

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spot-on.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

2 pipete (2 x 0,8 ml)

3 pipete (3 x 0,8 ml)

4 pipete (4 x 0,8 ml)

6 pipete (6 x 0,8 ml)

**5. SPECII ȚINTĂ**

Pisici și iepuri-animale de companie

**6. INDICAȚII**

Prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) pentru pisici cu greutatea corporală de 4 kg și mai mult.

Tratamentul infestărilor cu purici pentru iepuri-animale de companie cu greutatea corporală de 4 kg și mai mult.

Un tratament previne infestarea ulterioară cu purici timp de trei până la patru săptămâni la pisici și până la o săptămână la iepuri-animale de companie. Produsul poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru controlul dermatitei alergice la purici (DAP) la pisici, unde aceasta a fost diagnosticată anterior de un medic veterinar.





[Pictogramă - purici]

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Numai pentru uz extern.

~~Citiți prospectul înainte de utilizare.~~

**8. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu se utilizează la iepuri care sunt destinați consumului uman.

**9. ATENȚIONARE SPECIALĂ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

Nu tratați pisoi neînțărcați cu vârsta mai mică de 8 săptămâni.

Nu tratați iepurii-animale de companie cu o vârstă mai mică de 10 săptămâni.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună/an}

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se păstra blisterul în cutia de carton.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu produsul sau recipientele goale.

**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA**

Numai pentru uz veterinar.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bayer Animal Health GmbH,  
51368, Leverkusen,  
Germania


Produce de  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Str. Projensdorfer 324, 24106 Kiel  
Germania

**16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

150163

**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot: {număr}



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE  
AMBALAJ PRIMAR**

**Eticheta pipetei**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Advantage

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Imidacloprid(e) 80 mg

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE  
DOZE**

0,8 ml

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

**5. TIMP DE AȘTEPTARE**

**6. NUMĂRUL SERIEI**

Lot: {număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP: {lună/an}


**8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

[Pictogramă piscică]

≥ 4kg

[Pictogramă iepure]

≥ 4kg



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII**

**Blister**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Advantage, 80 mg/ pipetă, soluție spot-on pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie de talie mare

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Bayer Animal Health GmbH

**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP:{lună/an}

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Lot:{număr}

**5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

[Pictogramă pisică]

≥ 4kg

[Pictogramă iepure]

≥ 4kg

0,8 ml



## PROSPECT

Advantage, soluție spot-on pentru pisici și iepuri-animale de companie

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Bayer Animal Health GmbH,  
51368, Leverkusen,  
Germania

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,  
Str. Projensdorfer 324, 24106 Kiel,  
Germania

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Advantage, 40 mg/ pipetă, soluție spot-on pentru pisici de talie mică și iepuri-animale de companie de talie mică  
Advantage, 80 mg/ pipetă, soluție spot-on pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie de talie mare

Imidacloprid

### 3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

Fiecare pipetă cu soluție limpede de culoare galbenă până la maroniu conține:

	0,4 ml	0,8 ml
<b>Substanța activă:</b>		
Imidacloprid	40 mg	80 mg
<b>Excipienți:</b>		
Butilhidroxitoluen (E321)	0,4 mg	0,8 mg
Alcool benzilic (E1519)	332,8 mg	665,6 mg

### 4. INDICAȚII

Pentru prevenirea și tratamentul infestărilor cu purici (*Ctenocephalides felis*) la pisici și pentru tratamentul infestărilor cu purici la iepuri-animale de companie. Puricii sunt omorâți în decurs de o zi după tratament. Un tratament previne infestarea ulterioară cu purici timp de trei până la patru săptămâni la pisici și până la o săptămână la iepuri-animale de companie. Produsul poate fi utilizat ca parte a unei strategii de tratament pentru controlul dermatitei alergice la purici (DAP) la pisici, unde aceasta a fost diagnosticată anterior de un medic veterinar.

## 5. CONTRAINDICAȚII

Nu tratați pisoi neîntârcați cu vârsta mai mică de 8 săptămâni.  
Nu tratați iepurii-animale de companie cu o vârstă mai mică de 10 săptămâni.  
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.


## 6. REACȚII ADVERSE

Produsul are gust amar și ocazional, poate să apară salivație dacă animalul linge locul de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un semn de intoxicație și dispare în câteva minute fără tratament.  
În cazuri foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) pot să apară reacții cutanate cum ar fi: căderea părului, roșeață, mâncărime și leziuni ale pielii la pisici și iepuri. Agitație, salivație excesivă și semne nervoase: cum ar fi lipsă de coordonare, tremurături și depresie au fost, de asemenea, raportate, dar în mod excepțional la pisici. Ingerarea orală poate duce la alte semne gastro-intestinale (vărsături și diaree) care au fost observate foarte rar pe baza datelor de după comercializare.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)
- frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.



## 7. SPECII ȚINTĂ

Pisici și iepuri-animale de companie

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Acest produs este pentru uz extern și nu trebuie administrat pe cale orală. Animalele trebuie cântărite cu precizie înainte de tratament.


Orice instrucțiuni date de un medic veterinar pentru utilizarea acestui produs trebuie respectate.

Schema de dozare și tratament:

Greutatea pisicii, iepurelui [kg g.c.]	Produs	Număr de pipete	Imidacloprid [mg/kg g.c.]
< 4 kg	Advantage 40 mg pentru pisici de talie mică și iepuri-animale de companie	1 x 0,4 ml	minim 10
≥ 4 kg	Advantage 80 mg pentru pisici de talie mare și iepuri-animale de companie	1 x 0,8 ml	minim 10


### Mod de administrare


Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsuciți și scoateți capacul. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui prin răsucire și apăsare desigilați pipeta.



### Administrarea la pisici


Îndepărtați părul de pe gâtul pisicii la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.





#### Administrarea la iepuri

Îndepărtați părul de pe gâtul iepurelui la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele.



### **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Numai pentru uz extern.

Aplicarea la baza craniului, reduce la minim posibilitatea ca pisica să lingă produsul, vă rugăm să consultați și secțiunea *Reacții adverse*.

Aplicați numai pe pielea sănătoasă fără leziuni. Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă/îngrijească reciproc.

### **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu se utilizează la iepuri care sunt destinați consumului uman.

### **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra blisterul în cutia de carton.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutie, blister și pipetă după EXP. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.





## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

### Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Re-infestarea după apariția puricilor noi în mediul înconjurător poate continua să apară timp de șase săptămâni sau mai mult după inițierea tratamentului. Prin urmare, poate fi necesar mai mult de un tratament, în funcție de nivelul infestării cu purici din mediul înconjurător. Pentru a ajuta la reducerea încărcăturii din mediu, se recomandă utilizarea suplimentară a unui tratament pentru mediul înconjurător adecvat împotriva puricilor adulți și a etapelor lor de dezvoltare. Pentru a reduce în continuare provocarea ecologică, se recomandă ca toate pisicile și iepurii dintr-o gospodărie să fie tratați. Tratamentul pisicilor care alăptează combate infestarea cu purici atât pe femelă, cât și pe descendenți.

Produsul rămâne eficient dacă animalul devine umed, de exemplu după expunerea la ploii abundente.

Cu toate acestea, repetarea tratamentului poate deveni necesară, în funcție de prezența puricilor în mediul înconjurător. În aceste cazuri, nu tratați mai des de o dată pe săptămână.

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Acest produs este pentru uz extern și nu trebuie administrat pe cale orală.

Aplicați numai pe pielea sănătoasă fără leziuni.

Trebuie asigurate măsuri de precauție deoarece conținutul pipetei sau doza aplicată nu trebuie să vină în contact cu ochii sau cu gura animalului.

Nu permiteți animalelor tratate recent să se lingă/îngrijească reciproc.

Înainte de aplicarea produsului trebuie îndepărtată orice zgardă.

Înainte de a monta din nou zgarda, trebuie evaluată vizual zona tratată pentru a se verifica că este uscată.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la imidacloprid trebuie să evite contactul cu produsul.

Acest produs conține alcool benzilic și poate provoca sensibilizarea pielii sau reacții cutanate

tranzitorii în cazuri rare (de exemplu, iritații, furnicături).

Evitați contactul produsului cu pielea, ochii sau cu gura. Nu masați locul de aplicare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii bine cu multă apă.

Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, solicitați asistență medicală.


După aplicare, nu mângâiați sau îngrijiți animalele până când locul de aplicare nu este uscat.

Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat asistență medicală.

Spălați bine mâinile după utilizare.

### Gestație și lactație:

Nu au fost observate efecte toxice asupra reproducerii la șobolani și nu au fost observate efecte



toxice primare embriotoxice sau teratogene în timpul studiilor pe șobolani și iepuri. Studiile pe pisici gestante și pe cele care alăptează ca și pe descendenții lor sunt limitate. Rezultatele obținute până în prezent arată că nu apar efecte adverse la aceste animale.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu au fost observate interacțiuni între acest produs administrat în doză dublă și următoarele produse medicinale veterinare utilizate în mod frecvent: lufenuron, pirantel și praziquantel (pisici). A fost de asemenea demonstrată compatibilitatea produsului cu o gamă largă de tratamente de rutină aplicate în condiții de teren, inclusiv vaccinarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):

La pisici nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de cinci ori mai mari decât doza terapeutică administrată săptămânal, timp de opt săptămâni consecutiv. La iepuri nu au fost observate reacții adverse nici când s-au utilizat doze de până la 45 mg/kg greutate corporală ( de 4 ori doza terapeutică) administrate săptămânal timp de 4 săptămâni consecutiv.

În cazuri rare de supradozare sau linsul blăni tratate, la pisici pot să apară tulburări ale sistemului

nervos (cum ar fi zvâcniri, tremor, ataxie, midriază, mioză, letargie).

Este puțin probabil ca animalele să se otrăvească prin ingerare accidentală. În acest caz se aplică tratament simptomatic sub supraveghere medicală veterinară. Nu există antidot specific, dar poate fi benefică administrarea de cărbune medicinal activ.

Incompatibilități:

Nu se cunosc.

Alte precauții:

Solventul din acest produs poate păta anumite materiale, inclusiv piele, țesături, materiale plastice și suprafețe finisate. Lăsați locul de aplicare să se usuce înainte de a permite contactul cu astfel de materiale.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR**


Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre

în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice. Nu

contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu produsul sau recipientele goale.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

08.2021



## 15. ALTE INFORMAȚII

Studii suplimentare au demonstrat că pe lângă efectul adulticid (distructiv asupra puricilor adulți), imidacloprid are și un efect de distrugere larvicid (al larvelor de purici) care se găsesc în zona unde se află animalul tratat. Stadiile larvare ale puricilor din împrejurimile animalului de companie sunt distruse după ce vin în contact cu un animal tratat.

### Ambalaje:

Dimensiunea ambalajului	0,4 ml și 0,8 ml pentru o pipetă
	Blister cu 2 pipete, doză unică. Blister cu 3 pipete, doză unică. Blister cu 4 pipete, doză unică. Blister cu 6 pipete, doză unică.
Pipeta	Pipetă din polipropilenă albă cu capac înșurubat
Cutie de carton	Fiecare cutie de carton conține un blister.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de comercializare.

