

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 1,23 g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
 Bolfo, 4,442 g/zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**Substanță activă:**

Propoxur 98,7 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică	38 cm	12,5 g	1,23 g
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,442 g

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară, de culoare maro.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**4.1 Specii țintă**

Bolfo, 1,23 g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică (cu greutatea corporală până la 10 kg)

Bolfo, 4,442 g/ zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare (cu greutatea corporală ≥ 10 kg)

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini de talie mică (Bolfo, 38 cm) sau la câini de talie mare (Bolfo, 70 cm).

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau a organelor urinare, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la căței sub vârsta de 3 luni.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda.



Zgarda nu trebuie înghițită, suptă sau mestecată de oameni, în special copii.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă să se folosească și medicamente endoparazitare. Prin urmare, este important pentru o combatere eficientă a puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul înconjurător al câinelui să fie de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă propoxur sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți sfatul medicului.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

În cazuri foarte rare, pot apărea reacții la locul de aplicare, cum ar fi prurit, eritem, leziuni și pierderea parului.

În cazuri foarte rare unele animale pot prezenta o ușoară senzație de mâncărime sau înroșire a pielii după aplicarea zgărzii.

Foarte rar pot apărea simptome cum ar fi voma, diaree sau salivare după expunerea la produs pe cale orală.

A nu se folosi în caz de reacții de hipersensibilitate cunoscute la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate).

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației.

Substanța activă nu este clasificată ca embriotoxică, teratogenă sau toxică pentru reproducere, astfel încât asemenea efecte nu sunt așteptate la animale gestante sau în lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați animalul dumneavoastră cu alte insecticide în același timp cu folosirea zgărzii.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Bolfo zgardă (38cm) se utilizează pentru pisici și câini de talie mică (cu greutatea corporală de până la 10 kg)

Bolfo zgardă (70cm) se utilizează pentru câini de talie mare (cu greutatea corporală ≥ 10 kg)

Numai pentru uz extern!



Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni. Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor numai dacă este folosită în mod continuu.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metallic. Dacă locul zgâriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Sfaturi pentru o administrare corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.

Asigurați-vă că nu există resturi de conectorii de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între guler și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la aplicarea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Precum puricii care sunt prezenți pe câine, mediul înconjurător poate fi contaminat cu ouă de purici larve sau pupe. Acestea vor evolua în timp în noi purici. Prin urmare, este important pentru o combatere eficientă a puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul înconjurător al câinelui să fie de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În special dacă accidental părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivație, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: atropină sulfat.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru uz topic, inclusiv insecticide, carbamați,
Codul veterinar ATC: QP53AE02

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Insecticidele din grupa carbamaților prezintă o toxicitate moderată la mamifere, sunt metabolizate rapid și nu se acumulează în țesuturi.

Inhibarea colinesterazei, relativ de scurtă durată, este reversibilă.



5.2 Particularități farmacocinetice

Ingredientul activ este eliberat în mod continuu de către zgardă. Propoxur nu este absorbit din piele. Principalii metaboliți sunt O-hidroxifenil N-metilcarbamat și 2-izopropoxifenol; ultimul regăsiindu-se în urină ca glucuronidă. Urina este probabil principala cale de eliminare a acestui compus.

5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Acest produs este extrem de toxic pentru organismele acvatice, păsări și albine.

Nu permiteți câinilor care poartă această zgardă să înoate în cursuri de apă care conțin organisme acvatice.

Acest produs poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nu reutilizați ambalajul. Distrugeți sau eliminați ambalajele goale în conformitate cu cerințele locale.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

N dibutil-adipat,
propilenglicol dicaprilocat,
ulei de soia epoxidat,
acid stearic,
oxizi de fier (E172)
dioxid de titan (E171),
policlorură de vinil (PVC)

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar


O zgardă din policlorură de vinil, cu lungimea de 38 cm sau 70 cm, ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid și apoi introdusă într-o cutie de carton.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Nu se vor contamina râuri, lacuri, cursuri de apă, baraje și alte surse de apă cu acest produs.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen Germania



8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bolfo, 1,23 g/ zgardă antiparazitara, pentru pisici și câini de talie mică - 160279
Bolfo, 4,442 g/zgardă antiparazitara, pentru câini de talie mare - 160280

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI


04.10.1999 / 31.08.2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

01.2017

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



ANEXA 4.3



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie de carton pentru zgardă cu dimensiunea de 38 cm aflată în folie de poliester/peșteră


1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 1,23 g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
Propoxur

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

O zgardă (12,5 g) conține:
Substanță activă:
Propoxur 1,23 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ



Zgardă antiparazitară

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

38 cm

5. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini de talie mică (cu greutatea corporală până la 10 kg)

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini de talie mică.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.


8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII



EXP: {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen Germania

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

160279


17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot: {Număr}



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE FOLII

Bolfo, 1,23 g/zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
Folie de poliester/polietilenă



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 1,23g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
Propoxur

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE



3. DATA EXPIRĂRII


EXP {lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot{număr}

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



PROSPECT

Bolfo, 1,23g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
 Bolfo, 4,442g/ zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare: Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germania

Producător pentru eliberarea seriei: KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Bolfo, 1,23g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică
 Bolfo, 4,442g/ zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare
 Propoxur

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Substanță activă:

Propoxur 98,7 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică	38 cm	12,5 g	1,23 g
Bolfo zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,442 g

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru prevenirea și tratamentul infestării cu purici și căpușe la pisici și câini de talie mică (Bolfo, 38 cm) sau la câini de talie mare (Bolfo, 70 cm).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau a organelor urinare, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la căței sub vârsta de 3 luni.

Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.


Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare din excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

În cazuri foarte rare, pot apărea reacții la locul de aplicare, cum ar fi prurit, eritem, leziuni și pierderea parului.

În cazuri foarte rare unele animale pot prezenta o ușoară senzație de mâncărime sau înroșire a pielii după aplicarea zgărzii.

Foarte rar pot apărea simptome cum ar fi vomă, diaree sau salivație după expunerea la produs pe cale orală.



A nu se folosi în caz de reacții de hipersensibilitate cunoscute la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament),
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate).

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bolfo, 1,23g/ zgardă antiparazitară, pentru pisici și câini de talie mică (cu greutatea corporală până la 10 kg)

Bolfo, 4,442g/ zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare (cu greutatea corporală \geq 10 kg)

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂD) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Bolfo zgardă (38cm) se utilizează pentru pisici și câini de talie mică (cu greutatea corporală până la 10 kg)

Bolfo zgardă (70cm) se utilizează pentru câini de talie mare (cu greutatea corporală \geq 10 kg).

Numai pentru uz extern!

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni. Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor numai dacă este folosită în mod continuu.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele care sug sânge sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor.

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Pierderea efectului se poate verifica prin zgârierea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgâriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfaceți-o.


Asigurați-vă că nu există resturi de conectorii de plastic în interiorul zgărzii.

Reglați zgarda în jurul gâtului animalului fără a strânge prea strâns (ca un ghid, ar trebui să fie posibil să se introducă două degete între guler și gât).

Trageți excesul de zgardă prin buclă și tăiați orice lungime în exces mai mare de 2 cm. În special în cazul animalelor tinere potrivirea corectă a zgărzii se verifică în mod regulat și se ajustează.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la aplicarea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de aplicarea zgărzii.



Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

De asemenea, mediul înconjurător poate găzdui purici, ouă sau larve de purici. Acestea vor evolua în timp în purici. De aceea, pentru un tratament eficient împotriva puricilor, este necesară stropirea cu insecticide adecvate a mediului înconjurător din imediata apropiere a câinelui dumneavoastră.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării înscrisă pe cutia de carton după {EXP}. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda.

Zgarda nu trebuie înghițită, suptă sau mestecată de oameni, în special copii.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă să se folosească simultan și medicamente endoparazitare. Prin urmare, este important pentru o combatere eficientă a puricilor ca aceste stadii intermediare din mediul înconjurător al câinelui să fie de asemenea, combătute cu un insecticid adecvat, aprobat pentru această utilizare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă propoxur sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți sfatul medicului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestației.

Substanța activă nu este clasificată ca embriotoxică, teratogenă sau toxică pentru reproducere, astfel încât asemenea efecte nu sunt așteptate la animale gestante sau în lactație.


Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați animalul dumneavoastră cu alte insecticide în același timp cu folosirea zgărzii.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În special dacă accidental părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivație, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: atropină sulfat.



Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Acest produs este extrem de toxic pentru organismele acvatice, păsări și albine.

Nu permiteți câinilor care poartă această zgardă să înoate în cursuri de apă care conțin organisme acvatice.

Acest produs poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Nu reutilizați ambalajul. Distrugeți sau eliminați ambalajele goale în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

14. DATE IN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL


06.2020

15. ALTE INFORMAȚII**Dimensiuni de ambalaj:**

O zgardă din policlorură de vinil, cu lungimea de 38 cm sau 70 cm este ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid și apoi introdusă într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.