

FRONTPRO®

RÁGÓTABLETTA



1. Mi is az a FRONTPRO®?

A FRONTPRO® egy ízletes, könnyen beadható rágható tablettá, amely védelmet nyújt a kutyáknak a bolhák és kullancsok ellen. A FRONTPRO® rendszeres havi alkalmazása ajánlott a bolha és kullancs szezon idején.

2. Meddig nyújt védelmet a FRONTPRO® a kutyámnak a bolháktól és a kullancsoktól?

A FRONTPRO® rágótablettá egy hónapon keresztül nyújt védelmet kutyájának a bolhák és kullancsok ellen.

3. Hogyan pusztítja el a FRONTPRO® a bolhákat?

A FRONTPRO® hatóanyaga, az afoxolaner a bolhák és kullancsok idegrendszerére hat, túlstimulálja azt, amely a paraziták elpusztulásához vezet. A gyorsan kialakuló hatás miatt, a kifejlett bolhák a peterakás előtt elpusztulnak, ezzel is megelőzve a további fertőzéseket. A rendszeres havi alkalmazás ajánlott bolha és kullancs szezon idején, hogy kedvence és otthona is bolha mentes maradjon.

4. Mennyi idő alatt végez a FRONTPRO® a bolhákkal?

A FRONTPRO® a már kutyáján levő bolhákat a beadástól számított 8 órán belül elpusztítja.

5. Miért láthatok több bolhát a kutyámon a FRONTPRO® beadása után?

Mivel a FRONTPRO® túlstimulálja a bolhák központi idegrendszerét, amitől túlzott izgalmi állapotba kerülnek, ezért feljöhetnek a kutyák bundájának tetejére, ezért könnyebben észrevehetőek, miközben elhullanak.

6. Hatékony-e a FRONTPRO® egy súlyos bolhás fertőzés esetén?

Igen, a FRONTPRO® gyorsan végez a bolhákkal, még mielőtt megkezdénék a peterakást, ezzel megakadályozva a környezet további fertőződését. Amennyiben a kutya és környezete közepes vagy súlyos fertőzöttsége áll fenn, a már a kezelés megkezdése előtt jelen lévő petékből, lárvákból és bábokból fejlődő kifejlett bolhák jelenhetnek meg. Emiatt lehetséges, hogy több, mint 1 havi kezelés szükséges a közepes vagy súlyos bolhafertőzöttség kontrollálásához. Emiatt akár több hónapot is igénybe vehet a kezelés, hogy úrrá legyünk a súlyos bolhás fertőzésen.

7. A bolhák által egész évben veszélyeztetett területeken ajánlott a havi FRONTPRO® rágótablettá egész éves megszakítás nélküli alkalmazása. Az újrafertőződés esélyének minimalizálása érdekében fontos, hogy a háztartás minden állata kezelve legyen valamilyen törzskönyvezett bolhairtó készítménnyel.

8. Mennyi ideig nyújt védelmet a FRONTPRO® a kutyámnak a kullancsok ellen?

A FRONTPRO® egy teljes hónapig nyújt védelmet a kutyájának kullancsok ellen.

9. Megöli-e a FRONTPRO® a bolhákat minden fejlettségi állapotban?

A FRONTPRO® gyorsan végez a kifejlett bolhákkal, mielőtt azok megkezdénék a peterakást, így előzve meg a környezet további fertőződését. A rendszeres havi adagolás ajánlott, hogy kedvence és otthona is bolha mentes maradjon.

10. Lehet-e bolhás a kutyám a FRONTPRO® alkalmazása után is?

A FRONTPRO® gyorsan végez a kifejlett bolhákkal és a kezelés hatása a bolhák ellen 5 hétig tart. Ennek eredményeképp a kutyájára kerülő bolhák egy teljes hónapon keresztül elpusztulnak. A gyors reakciónak köszönhetően a kifejlett bolhák már azelőtt elhullanak, hogy megkezdénék a peterakást, ezzel megelőzve környezet további fertőződését. A rendszeres havi adagolás ajánlott, hogy kedvence és otthona is bolha mentes maradjon.

11. Hogyan végez a FRONTPRO® a kullancsokkal?

A FRONTPRO® hatóanyaga, az afoxolaner a bolhák és kullancsok idegrendszerére hat, túlstimulálja azt, amely a paraziták elpusztulásához vezet.

12. Milyen gyorsan végez a FRONTPRO® a kullancsokkal?

A FRONTPRO® megszünteti a már jelen lévő kullancs fertőzést 48 órán belül.

13. Beadható-e a FRONTPRO® macskáknak és más kisállatoknak?

Nem. A FRONTPRO® rágótablettá kizárólag kutyáknak adható.

FRONTPRO®
RÁGÓTABLETTA

14. Táplálékkal kell-e beadni a FRONTPRO®-t?

Más kezelésekkel ellentétben a FRONTPRO®-t nem szükséges táplálékkal beadni. Bármikor beadható a rágótabletta a kutyájának, amikor az önnek megfelel, táplálékkal vagy anélkül.

15. Meddig tart a FRONTPRO® hatása?

A FRONTPRO® egy hónapon keresztül nyújt védelmet a bolhák és kullancsok ellen.

16. Mik a FRONTPRO® mellékhatásai?

Az afoxolaner az izoxazolinok hatóanyag csoportjába tartozik. Nemkívánatos esemény az izoxazolinok alkalmazását követően nagyon ritkán fordul elő; nagyon ritkán előfordulhat hányás, hasmenés, kedvetlenség, étvágytalanság, viszketés és idegrendszeri tünetek, mint rángatózás, koordináció hiánya és izomremegés. A legtöbb nemkívánatos reakció enyhe és átmeneti. Ha bármilyen észrevétele van, kérjük keresse fel állatorvosát vagy a Boehringer Ingelheim helyi képviselőjét a következő e-mail címe(ke)n: ahhupv.bud@boehringer-ingelheim.com és/vagy az ah.hu@boehringer-ingelheim.com.

17. Mennyi idő alatt kezd hatni a FRONTPRO®?

A FRONTPRO® hatóanyaga 2 és 4 óra között éri el a maximális plazma koncentrációt, amellyel gyorsan kifejlődik a bolhák elleni védelem. A beadást követően a bolhák 8 órán belül elpusztulnak.

18. Használható-e a FRONTPRO®, ha kutyám más gyógyszert is kap?

Egyelőre nem készültek tanulmányok a FRONTPRO® és más gyógyszer egyidejű használatáról. Jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés vagy ellenjavallat semelyik másik gyógyszer leírásában sem a FRONTPRO® alkalmazásával szemben. Ha bármilyen észrevétele van, kérjük keresse fel állatorvosát.

19. Mi a teendő, ha a kutyámon váratlan reakciók jelentkeznek a FRONTPRO® beadása után?

Amennyiben úgy hiszi, hogy nem várt reakciót váltott ki a kutyájából a FRONTPRO® lenyelése, kérjük keresse fel az állatorvosát vagy vegye fel a kapcsolatot a Boehringer Ingelheim helyi képviselőjével a következő e-mail címe(ke)n: ahhupv.bud@boehringer-ingelheim.com és/vagy az ah.hu@boehringer-ingelheim.com.

20. Mi történik, ha egy kutya több FRONTPRO® rágótablettát is megeszik?

A biztonságossági tanulmányok kimutatták, hogy a FRONTPRO® széles biztonsági küszöbvel rendelkezik, de mindenesetre, amennyiben a kutyája több FRONTPRO® rágótablettát is megevett, kérjük azonnal vegye fel a kapcsolatot állatorvosával.

21. Lehet-e biztonságosan alkalmazni a FRONTPRO®-t epilepsziás kutyákon?

Az afoxolaner az izoxazolinok hatóanyag csoportjába tartozik. Erre a csoportra adott kedvezőtlen reakciók között nagyon ritka esetben előfordulhatnak rohamok. Eddig nem jöttek létre epilepsziás kutyákról szóló tanulmányok a FRONTPRO®-val kapcsolatban, ezért a kezelés hatása a rohamok sűrűségére egyelőre ismeretlen. Kérjük vegye fel a kapcsolatot állatorvosával további információért.

22. Veszélyes-e a FRONTPRO® az emberekre, ha azt véletlen lenyelik?

A FRONTPRO® okozhat gyomor és bélrendszeri zavart, ha emberi szervezetbe kerül. Amennyiben véletlen lenyelik, kifejezetten gyermekek esetében, azonnal keressen orvosi segítséget és mutassa meg a termék használati utasítását az orvosnak. Súlyos esetben hívjon mentőt.

A véletlenszerű lenyelés elkerülése érdekében, kérjük tartsa távol a gyermekektől a készítményt és egyszerre csak egy tablettát vegyen ki a lefóliázott hátú levélből és rögtön adja be a kutyájának a kivétel után. Kérjük bármilyen emberi kitettség esetén jelezze azt a Boehringer Ingelheim helyi képviselőjének a következő e-mail címe(ke)n: ahhupv.bud@boehringer-ingelheim.com és/vagy az ah.hu@boehringer-ingelheim.com.

23. Biztonságosan alkalmazható-e FRONTPRO® bármelyik kutyafajtán?

A FRONTPRO® biztonságosan alkalmazható és hatásosnak bizonyult számos kutyafajta esetén (collie fajták esetén is). Kölyökkutyáknak is adható 8 hetes kortól, amennyiben elérik a 2 kilogrammot. Az afoxolaner az izoxazolinok hatóanyag csoportjába tartozik. Nemkívánatos esemény az izoxazolinok alkalmazását követően nagyon ritkán fordul elő; nagyon ritkán előfordulhat hányás, hasmenés, kedvetlenség, étvágytalanság, viszketés és idegrendszeri tünetek mint rángatózás, koordináció hiánya és izomremegés. A legtöbb nemkívánatos reakció enyhe és átmeneti. Körültekintően használja a terméket epilepsziás vagy bármilyen egyéb rohamokat okozó betegséggel küzdő kutya esetén. Ha bármilyen észrevétele van, kérjük keresse fel állatorvosát vagy a Boehringer Ingelheim helyi képviselőjét a következő e-mail címe(ke)n: ahhupv.bud@boehringer-ingelheim.com és/vagy az ah.hu@boehringer-ingelheim.com.